



## **ASUNTO: VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN PACIENTES CON MIASTENIA**

Desde el Comité Científico de AMES indicamos que la recomendación general en pacientes con miastenia es la de vacunarse frente a la Covid 19. Esta recomendación se extiende a las 3 tipologías de vacunas que actualmente hay aprobadas en España (Pfizer, Moderna y AstraZeneca).

En cualquier caso, la particularidad de cada paciente hará que esta recomendación pueda variar, por lo que deberán consultar con su médico/a especialista si así se estima oportuno.

En pacientes a los que se administre medicación monoclonal, la recomendación general es dejar pasar entre 3 y 6 meses desde la última ingesta o perfusión antes de la vacuna, en estos casos si será recomendable consultar siempre antes de la vacunación, por otro lado, la segunda dosis de vacuna se administraría como máximo 6 semanas antes del siguiente ingesta/perfusión.

Valencia, 1 de abril de 2021

### **COMITÉ CIENTÍFICO AMES**

Dra. D<sup>a</sup>. Isabel ILLA. Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Dr. D. Juan J Vílchez. Hospital Universitari i Politecnic La Fe.

Dr. D. Antonio Guerrero Sola. Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

Dr. D. Adolfo López de Munain. Hospital Donostia, San Sebastián.

Dra. D<sup>a</sup> Carmen Paradas. Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Dr. D. Julio Pardo. Hospital Clínico Universitario, Santiago de Compostela.

Dr. D. José E. Meca Lallana. Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.